



Fenilacetato (Phenylacetate)

En el Centro Clínico es referido como Fenilacetato.

Cómo se Administra:	Intravenosamente (por vena)
Mecanismo de Acción del Fármaco:	El Fenilacetato se encuentra en pequeñas cantidades en el cuerpo. En cantidades mayores puede disminuir o detener el crecimiento de las células del cáncer.
Efectos Secundarios:	<ol style="list-style-type: none">1. Adormecimiento y la posibilidad de sentir sueño durante el día (somnolencia) pueden ocurrir. Estos síntomas se resolverán cuando el fármaco (medicamento) se suspenda.2. La náusea y el vómito pueden ocurrir.3. Puede ocurrir inflamación de sus manos y pies.4. Su piel puede tener un olor desagradable durante el tratamiento.
Instrucciones Especiales:	<ol style="list-style-type: none">1.No tome algún medicamento prescrito o medicamento para el cual no se necesite una receta médica sin antes hablar con su médico del NIH. Éstos incluyen vitaminas, tratamientos herbales, gotas para la nariz, medicamentos contra el resfriado, gripe, fiebre, dolor de cabeza, dolor, fiebre del heno o las alergias.2. No maneje un carro, opere maquinaria o realice alguna actividad que requiera estar alerta mentalmente, hasta que usted conozca su reacción a este fármaco3.Tome medicamentos contra la náusea de acuerdo con las instrucciones, aún si no tiene náusea.4.Llame a su médico o enfermera del NIH si usted:

- se siente soñoliento(a) durante el día de tal manera que hace que sea difícil realizar sus actividades usuales
- presenta inflamación de sus manos y los pies
- no puede tomar líquidos por más de 1 día o no puede comer por más de 2 días después del tratamiento.



Esta información es preparada específicamente para pacientes que participan en la investigación clínica en el Centro Clínico Warren Grant Magnuson de los Institutos Nacionales de Salud y no es necesariamente aplicable a individuos que son pacientes en otra parte. Si tiene preguntas acerca de la información que se presenta aquí, hable con un integrante de su equipo de atención médica.

Series Viviendo con Quimioterapia para el
Cáncer Borrador/Septiembre de 1998
Institutos Nacionales de Salud, CC
Departamento de Enfermería